

**MIRALAX (میرالیکس) کولونواسکوپمی کی تیاری**

مسٹر / مسز / محترمہ -

تاریخ اور وقت:

اس طریق کار میں پورے قولوں یا بڑی آنت کی جانچ کی جاتی ہے۔ اسے جریان خون، رفع حاجت کی عادتوں میں تبدیلی کی علامات کی وضاحت میں مدد کیلئے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ہایوپسیز لینے اور اگر کہیں موجود ہو تو سلعمہ مخاطی (Polyps) کو نکالنے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ کو ایک معیاری رضامندی فارم پر دستخط کرنے کو کہا جائے گا۔ میڈیسن میں دیگر جراحیاتی طریق کاروں کی طرح، کولونواسکوپمی میں جن چیزوں کا بہت معمولی لیکن واقعی خطرہ ہے ان میں شامل ہیں جریان خون، انفیکشن، اور سوراخ ہونا جس کیلئے سرجری کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ یہ ایک مکمل جانچ نہیں ہے اور اس میں سلعمہ مخاطی اور کینسر کے تشخیص مرض میں چوک ہوسکتی ہے۔ اس فارم پر دستخط کرکے آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ اس سے آگاہ ہیں۔ براہ کرم اپنا کوئی بھی سوال 718-368-2960 پر بلا جھجک پوچھیں۔

فارمیسی سے خریدنے کیلئے:



**2 GATORADES**

32 اونس کی دو بوتلیں  
(سرخ / چیری کے رنگ کا نہیں)



یا **MIRALAX**

**Polyethylene Glycol 3350\***  
238 گرام کی بوتل



**DULCOLAX pills**

یا  
**Bisacodyl tablets**  
5 گرام کی گولیاں

صرف 4 کی ضرورت ہے



**1 CITROMA**

یا **\*Magnesium Citrate**  
(چیری بالکل نہیں!)  
300 سی سی یا 300 ملی لیٹر

\* براہ کرم آگاہ رہیں کہ، جنرک آئٹمز مثالی طور پر برانڈ نام کے مساوی ہوتے ہیں اور آپ کے پلان کے لحاظ سے یہ کم لاکٹ والے ہوسکتے ہیں۔

جانچ سے قبل والے دن: کوئی ٹھوس چیز نہ کھائیں۔ آپ کو کافی زیادہ مقدار میں شفاف سیالوں کا استعمال کرنا چاہیے!

\* **MIRALAX** یا **Polyethylene Glycol 3350** کو **GATORADE** کے 32 اونس والی دو بوتلیوں میں ملائیں (**MIRALAX** کو برابر تقسیم کریں۔ بہت اچھی طرح بلائیں۔ پینے کے لیے تیار ہونے تک اسے ریفریجریٹر میں رکھ دیں۔

• سرخ رنگ والی کوئی چیز نہ پیئیں!!!

کافی زیادہ مقدار میں شفاف سیال پیئیں جیسے:

\* مرغ کی یجنی یا سبزیوں کی یجنی \* سیب کا رس، لیموں برف اور پوپ سیکلز

\* ادرک کا بیئر، اسپرائٹ، 7 - اپ، ماؤنٹین ڈیو \* پانی

مورخہ \_\_\_\_\_ کو صبح / شام \_\_\_\_\_ بجے سے شروع کرکے: **CITROMA** یا **Magnesium Citrate** (300 ملی لیٹر) کی ایک بوتل پیئیں

مورخہ \_\_\_\_\_ کو صبح / شام \_\_\_\_\_ بجے سے شروع کرکے **DULCOLAX** یا **Bisacodyl** ٹیبلیٹ لیں اس میں سے ہر ایک 5 گرام

مورخہ \_\_\_\_\_ کو صبح / شام \_\_\_\_\_ بجے سے شروع کرکے **MIRALAX/GATORADE** دوسرا 32 اونس 2 گھنٹوں کے اندر ملائیں

تمام سیال اشیاء مورخہ \_\_\_\_\_ کو صبح / شام \_\_\_\_\_ بجے سے بند کر دیں

\* براہ کرم جانچ سے قبل کے 3 دنوں میں بیجوں کا بالکل استعمال نہ کریں! \*

**دوائیں**

- تمام معمول کی دوائیں لیں سوائے ذیابیطس کی گولیوں کے۔
- اگر چہ یہ بہتر ہے کہ آپ "خون کو پتلا کرنے والی دوائیں" لینا بند کر دیں جس کی وضاحت ذیل میں کی گئی ہے، جانچ کی تیاری کیلئے آپ کو اپنے ڈاکٹر یا کارڈیولوجسٹ سے معلوم کر لینا چاہیے کہ آیا آپ دوائیں لینا بند کرسکتے ہیں۔ ذیل میں عمومی رہنما ہدایات ہیں:

اگر آپ لیتے ہیں: ← **Plavix, Pletal, Pradaxa, Effient, Aggrenox** تو جانچ سے 7 دن قبل اسے لینا بند کر دیں

اگر آپ لیتے ہیں ← **Coumadin, Warfarin** تو جانچ سے 3 دن قبل اسے لینا بند کر دیں

اگر آپ لیتے ہیں: ← **Fragmin, Lovenox** تو جانچ سے 24 دن قبل اسے لینا بند کر دیں

اگر آپ لیتے ہیں: ← **Iron pills** تو جانچ سے 7 دن قبل اسے لینا بند کر دیں

اگر آپ لیتے ہیں: ← **Aspirin** تو اسے جاری رکھ سکتے ہیں

اگر آپ کو **ذیابیطس** ہے: اگر آپ انسولین لیتے ہیں تو، انسولین کی آدھی خوراک لیں۔ ذیابیطس کی کوئی کھائی جانے والی دوا نہ لیں۔

جانچ کے بعد، یہ ضروری ہے کہ آپ کو کوئی لے کر گھر آئے۔ جانچ کے بعد آپ ڈرائیو نہیں کرسکتے یا مشینری نہیں چلا سکتے۔ اگر کوئی سوالات ہوں تو دفتر کو 718-368-2960 پر کال کریں۔