

التحضير لمنظار القولون باستخدام MIRALAX

السيد/السيدة/الأنسة:
التاريخ والوقت:

هذا الإجراء هو عبارة عن فحص للقولون بأكمله أو للأمعاء الغليظة، وهو مُصمَّم للمساعدة في تفسير أعراض مثل النزيف والتغير في عادات الأمعاء أو الآم البطن. ويُمكن المنظار القولوني الطبيب من أخذ عينات واستئصال الزوائد القولونية، في حالة اكتشافها. وسوف يُطلب منكم التوقيع على نموذج استمارة الموافقة. وهذا الإجراء مثل الإجراءات الباضعة الأخرى في الطب ينطوي على خطر بسيط لكنه خطر حقيقي فيما يتعلق بمنظار القولون ويتضمن النزيف والعدوى والانتقاب مما قد يتطلب إجراء جراحة. ولا يمثل ذلك فحصًا مثاليًا حيث قد يفقد حتى إلى علم الأمراض مثل الزوائد اللحمية والسرطان. وتوقيعك على هذه الاستمارة يعني إقرار منك بمعرفتك بذلك. ويسرنا تلقي أية أسئلة أو استفسارات على الرقم 718-368-2960.

للشراء من الصيدلية:



GATORADES ٢
(زجاجتين ٣٢ أونصة)
(ليس أحمر اللون وبدون كرز)

MIRALAX أو بولي إيثيلين
جلايكول *٣٣٥٠
زجاجة ٢٣٨ جم

حبوب **DULCOLAX** أو
أقراص **Bisacodyl***
٥ مجم
٤ فقط

CITROMA 1
أو سيترات المغنسيوم*
(بدون كرز)
٣٠٠ سم³ أو ٣٠٠ مليلتر

* يرجى العلم أن الأصناف العامة تكون عادة مساوية لاسم العلامة التجارية وقد تكون أقل تكلفة وفقًا لبرنامج العلاج الخاص بك

في اليوم السابق على الفحص: يتمتع المريض عن تناول الأطعمة الصلبة. ويجب تناول كميات كبيرة من السوائل الشفافة!

*اخلط زجاجة 238 جرام من **MIRALAX** أو البولي إيثيلين جلايكول 3350 مع زجاجتين ٣٢ أونصة من **GATORADE**. (قم بتقسيم **MIRALAX** بالتساوي تقريبًا. رج العبوة جيدًا. وتُحفظ في الثلاجة حتى تكون جاهزة للشرب).

■ لا تتناول أية مشروبات حمراء اللون.

يُرجى تناول كميات كبيرة من السوائل الشفافة مثل:

*حساء الدجاج أو حساء الخضار
*ماء

في بداية من صباحًا/ مساءً: رجاء تناول زجاجة واحدة من **CITROMA** أو سيترات المغنسيوم (300 مليلتر)
في بداية من صباحًا/ مساءً: رجاء تناول ٤ حبوب **DULCOLAX** أو حبوب **Bisacodyl** 5 مجم لكل منهما
في بداية من صباحًا/ مساءً: رجاء شرب أول 32 أونصة من مزيج **GATORADE / MIRALAX** على مدار ساعتين
في بداية من صباحًا/ مساءً: رجاء شرب ثاني 32 أونصة من مزيج **GATORADE / MIRALAX** على مدار ساعتين

توقف عن تناول كافة السوائل في بعد صباحًا/مساءً
يُرجى عدم تناول أي بقوليات خلال الثلاثة (٣) أيام السابقة على الفحص!

لا تتناول أية مشروبات حمراء اللون!

الأدوية

- يُمكنك تناول جميع الأدوية المعتادة باستثناء حبوب السكري.
- على الرغم من أنه يُفضل التوقف عن تناول أدوية "سيولة الدم" كما هو مبين أدناه، فإنه يجب مراجعة الطبيب المعالج أو طبيب القلب إذا كان يُمكنك التوقف عن تناول الأدوية للاستعداد للفحص، وفيما يلي إرشادات عامة:
إذا كنت تتناول **Aggrenox, Effient, Pradaxa, Pletal, Plavix, Warfarin, Coumadin** ← توقف عن تناولها لمدة ٣ أيام قبل الفحص
إذا كنت تتناول **Lovenox, Fragmin** ← توقف عن تناولها لمدة ٢٤ ساعة قبل الفحص
إذا كنت تتناول حبوب الحديد ← توقف عن تناولها لمدة ٧ أيام قبل الفحص
إذا كنت تتناول **Aspirin** ← يُمكنك الاستمرار في تناوله
إذا كنت تُعاني من مرض السكري: إذا كنت تتناول الأنسولين، يُمكنك تناول نصف جرعة الأنسولين، ولا تتناول أي أدوية لمرض السكري عن طريق الفم.

بعد الفحص، يجب أن يصطحبك شخص إلى المنزل. ولا يُمكنك القيادة أو تشغيل الآلات بعد الفحص. في حالة وجود أية استفسارات، رجاء الاتصال بالمكتب على الرقم 718-368-2960.