

**ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ С ПОМОЩЬЮ «ГоуЛайтли» (GoLyteLy )**

Г-н/Г-жа \_\_\_\_\_

Дата и время: \_\_\_\_\_

Данная процедура представляет собой обследование всей ободочной кишки или толстого кишечника. Она разработана для того, чтобы объяснить возникновение таких симптомов, как кровотечение, изменение ритма опорожнения кишечника или боль в животе. Процедура позволяет взять биопсию и удалить полипы, если они обнаруживаются. Вам предложат подписать стандартную форму согласия на процедуру. Как и в случае других инвазивных медицинских процедур, существует небольшой, но реальный риск возникновения кровотечения, инфекции или перфорации в результате колоноскопии, которые могут потребовать хирургического вмешательства. Данный метод обследования не является идеальным, поэтому существует даже возможность того, что такая патология, как полипы и злокачественные новообразования, может быть пропущена. Подписывая форму согласия, вы подтверждаете, что ознакомились с данной информацией. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь по телефону 718-368-2960.

**Что надо взять в аптеке:**

CITROMA или цитрат магния

300 мл или 300 см<sup>3</sup>

НЕ КРАСНЫЙ И НЕ ВИШНЕВЫЙ.

ТОЛЬКО ЛИМОННЫЙ!



Набор для подготовки GoLyteLy  
(по рецепту)



**А ТАКЖЕ**

**За день до обследования: НЕ ЕШЬТЕ ТВЕРДУЮ ПИЩУ. Пейте в большом количестве ПРОЗРАЧНЫЕ  
жидкости, такие как:**

**\*\* НЕ ПЕЙТЕ ЖИДКОСТИ  
КРАСНОГО ЦВЕТА!!\*\*\***

\* Вода, чай (с медом и сахаром. БЕЗ МОЛОКА)

\* Процеженный куриный или овощной бульон

\* Яблочный сок, лимонад, фруктовый лед

\* Желе Jell-O (кроме вишневого)

\* Напитки Sprite, 7-Up, Ginger Ale

1. \_\_\_\_\_, начиная с: \_\_\_\_\_ ч. утра/вечера: Медленно выпейте 1 флакон CITROMA или цитрата магния.

2. \_\_\_\_\_, начиная с: \_\_\_\_\_ ч. утра/вечера: Наполните емкость GoLyteLy водой и тщательно перемешайте встряхиванием.

В течение 4 часов выпейте весь галлон ЗАПИВАЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ.

- Можно заранее смешать этот раствор для питья и поместить его в холодильник.

\*\*\*\* Продолжайте пить жидкости весь день до отхода ко сну\*\*\*\*

ПРЕКРАТИТЕ ПРИЁМ ЖИДКОСТЕЙ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ \_\_\_\_\_ ч. утра/вечера

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ**

- Принимайте все препараты, как обычно, за исключением АНТИДИАБЕТИЧЕСКИХ таблеток.
- НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ ПРИЕМ «РАЗЖИЖАЮЩИХ КРОВЬ» ПРЕПАРАТОВ, КАК УКАЗАНО НИЖЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ СПРОСИТЬ У СВОЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА ИЛИ КАРДИОЛОГА, МОЖНО ЛИ ПРЕКРАЩАТЬ ПРИЕМ ЭТИХ ПРЕПАРАТОВ для подготовки к обследованию. Существует повышенный риск кровотечения, если вы не прекратите прием таких лекарств ЗАБЛАГОВРЕМЕННО перед обследованием. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

Если вы принимаете: **эффиент** (прасугрель), **агренокс** (дипиридамол) → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 7 ДНЕЙ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **прадакса** (дабигатран), **ксарелто** (ривароксабан), **эликвис** (апиксабан) → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 3 ДНЯ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **кумадин** (варфарин) → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 3-4 ДНЯ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **фрагмин, ловенокс** → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА СУТКИ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **пилюли железа, трентал** (дипиридамол) → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 7 ДНЕЙ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **трентал** (дипиридамол), **персантин** (дипиридамол), **агренокс** (дипиридамол) → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 7-10 ДНЕЙ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **тиклид** (тиколидин) → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 10-14 ДНЕЙ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **плетал** (цилостазол) → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 2 ДНЯ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **лавиекс** (клопидогрель) → ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 5 ДНЕЙ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Если вы принимаете: **аспирин** → МОЖЕТЕ ПРОДОЛЖАТЬ ПРИЕМ

Если вы страдаете **диабетом** → ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ИНСУЛИН, ПРИМИТЕ ПОЛОВИНУ ДОЗЫ ИНСУЛИНА. НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ ПЕРОРАЛЬНЫЕ АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ.

После обследования договоритесь, чтобы вас отвезли домой. Вы не можете самостоятельно вести автомобиль или управлять механизмами после обследования. Если у вас возникли какие-либо вопросы, позвоните в кабинет по телефону 718-368-2960.