

MIRALAX COLONOSCOPY PREP ערכת הכנה

גברת / מר _____

תאריך ושעה: _____

הליך זה הוא בדיקה של כל מעי הגס. הבדיקה מכוונת לגלוי סיבות לתסמינים מסוימים כגון דימום, שינוי בפעולת המעיין או כאבי בטן. הבדיקה מאפשרת לקיחת ביופסיות והסרת פוליפים, אם ימצאו. תתבקשי לחתום על טופס הסכמה סטנדרטי. כמו בכל הליך רפואי פולשני אחר קיימים סיכונים קטנים אך ממשיים בקולונסקופיה, הכוללים דימום, זיהום וניקוב, אשר עלול לחייב ניתוח. הבדיקה אינה בדיקה מושלמת ועלולה אפילו להחמיץ פתולוגיה כגון פוליפים וסרטן. על ידי חתימה על הטופס, אתה מאשרת שאתה מודעת לעובדה זו. ניתן להתקשר עם שאלות ל-718-368-2960.

לקנות בבית המרקחת:



GATORADES 2
(שני בקבוקי 32 OZ)
(לא אדום/דובדבן!)



DULCOLAX או
***Polyethylene Glycol 3350**
בקבוק של 238 גרם



MIRALAX
או
*** Bisacodyl**
כדורי 5 כדורים



CITROMA 1
או **Magnesium Citrate** ככדורי *
(לא דובדבן!)
מל 300 300 cc

* שים לב: מוצרים כלליים הם בדרך כלל שווים למוצרים מותגים ועשויים להיות יותר זולים, בהתאם לתוכנית הביטוח שלך.

יום לפני הבדיקה: לא לאכול מזון מוצק. צריך לשתות כמויות גדולות של נוזלים צלולים!

* לערבב את הבקבוק עם 238 גרם **MIRALAX** או **Polyethylene Glycol 3350** עם שני בקבוקים של 32 OZ של **GATORADE**. (חלקי את ה-**MIRALAX** בערך שווה. לנער היטב. לשים במקרר עד שמוכן לשתיה).

אדום צבע עם דברים לשתות לא!

שתהי הרבה נוזלים צלולים כמו:

* מיץ תפוחים, קרח וקרטיבים לימון

* מרק עוף או מרק ירקות

up, Mountain Dew-Ginger Ale, Sprite, 7*

*מים

ב- _____ החל משעה: _____ שתהי 1 בקבוק **CITROMA** או **Citrate Magnesium** (300 מ"ל)

ב- _____ החל משעה: _____ קח/י 4 כדורי **DULCOLAX** או **Bisacodyl** שכל אחד 5 מ"ג.

ב- _____ החל משעה: _____ שתהי 32 ozs ראשונים של **MIRALAX/GATORADE** משך 2 שעות.

ב- _____ החל משעה: _____ שתהי 32 ozs שניים של **MIRALAX/GATORADE** משך 2 שעות.

הפסקי את כל הנוזלים ב- _____ אחרי השעה _____

*** נא לא לאכול זרעים משך 3 ימים לפני הבדיקה!***

לא לשתות דברים עם צבע אדום!

תרופות

- קח/י **כל** התרופות הרגילות **חוץ מכדורי** הסכרת.
- למרות שעדיף להפסיק לקחת "מדללי דם", כפי שמפרוט במשך, **עליך לשאול את הרופא או את הקרדיולוג שלך האם אתה יכולה להפסיק לקחת תרופות** כהכנה לבדיקה. להלן הנחיות כלליות:

אם אתה לוקחת: **Plavix, Pletal, Pradaxa, Effient, Aggrenox** → הפסקי 7 ימים לפני הבדיקה

אם אתה לוקחת: **Coumadin, Warfarin** → הפסקי 3 ימים לפני הבדיקה

אם אתה לוקחת: **Fragmin, Lovenox** → הפסקי 24 שעות לפני הבדיקה

אם אתה לוקחת: **כדורי ברזל** → הפסקי 7 ימים לפני הבדיקה

אם אתה לוקחת: **אספירין** → ניתן להמשיך לקחת

אם יש לך **סכרת**: אם אתה לוקחת אינסולין, קח/י חצי מנת אינסולין. אל תקח/י תרופות אורליות לסכרת.

משהו צריך לקחת אותך הביתה לאחר הבדיקה. לאחר הבדיקה אתה לא יכולה לנהוג או להפעיל מכונות. אם יש לך שאלות,

נא להתקשר למשרד 718-368-2960.